

# МОСКОВСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ХИМИИ

## 2011-2012 УЧЕБНОГО ГОДА

### 11 КЛАСС (автор М.А. Ильин)

#### *Ответы на теоретические вопросы*



1. Координационная формула моногидрата сульфата тетраамминмеди(II) –  $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]\text{SO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ .

2. Типы химических связей присутствуют в кристаллическом  $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]\text{SO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ :


- ковалентные полярные (связи N–H, Cu–N, S=O, O–H),
- ионные (между комплексными частицами  $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$  и сульфат-ионами),
- водородные (например, между молекулами кристаллизационной воды).

Механизмы образования ковалентных связей в этом соединении: «обменный» и донорно-акцепторный.

3. Уравнения реакций, которые протекали при добавлении а) недостатка и б) избытка аммиака к раствору сульфата меди(II):



(примечание: допускается также запись уравнения образования вместо гидроксида меди ее основных солей)



4. Для расчета выхода продукта реакции ( $\eta$ ) необходимо знать массу полученного соединения ( $m_{эксп.}$ ) и массу продукта, рассчитанную на введенное количество медного купороса:

$$\eta = \frac{m_{эксп.}}{m_{теор.}} \cdot 100\%;$$


$$m_{теор.} = \frac{m_{навески} (\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O})}{M(\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O})} \cdot M([\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]\text{SO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}) = \frac{m_{навески} (\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O})}{250 \text{ г / моль}} \cdot 246 \text{ г / моль.}$$

(примечание: поскольку значение рассчитанного участником выхода сильно влияет на выставляемый балл, членам комиссии следует обратить внимание на полноту высушивания осадка и правильность его взвешивания участником)

### Изучение некоторых свойств полученного соединения

#### **Опыт 1.**

При нагревании сине-фиолетовые кристаллы полученного соединения разлагаются с образованием светло-голубого сульфата меди(II):



На более холодных стенках пробирки конденсируются капли воды (точнее, аммиачной воды (воды, содержащей растворенный в ней аммиак)).



Влажная индикаторная бумажка, поднесенная к отверстию пробирки, фиксирует выделение газообразного аммиака (проявляющего основные свойства) и изменяет свой цвет.

#### **Опыт 2.**


Уравнение реакции диссоциации полученного комплексного соединения в водном растворе:



При кипячении раствора полученного комплекса протекает его акватация и последующий гидролиз. Поскольку образующийся при этом гидроксид меди(II) термически неустойчив, он разлагается с образованием черного оксида меди(II) (в виде налета на стенках пробирки):




Черный налет оксида меди(II), образовавшийся на стенках пробирки, полностью растворяется в кислотах:



#### **Опыт 3.**


Для доказательства присутствия сульфат-ионов в растворе полученного соединения можно воспользоваться качественной реакцией с раствором солей бария:



При этом выпадает белый осадок сульфата бария (на самом деле, в данном случае осадок имеет светло-голубую окраску за счет частичной сорбции ионов меди из раствора).

#### ***Опыт 4.***

При добавлении раствора гидроксида натрия полученное комплексное соединение разрушается и выпадает голубой осадок гидроксида меди(II):




#### ***Опыт 5.***

В кислой среде полученное комплексное соединение также разрушается и окраска раствора изменяется с сине-фиолетовой на голубую:



При добавлении КІ к получившемуся в пробирке раствору, содержащему ионы  $\text{Cu}^{2+}$ , происходит окислительно-восстановительная реакция, сопровождающаяся образованием иода и выпадением осадка иодида меди(I):



#### *Система оценивания экспериментального труда*

При ознакомлении с системой оценивания членам жюри и преподавателям, наблюдающим в лаборатории за ходом выполнения эксперимента, необходимо ознакомиться также с пояснительной запиской (для организаторов)

#### Проведение синтеза соединения

*Техника эксперимента* 1,5 балла;

*Выход комплексного соединения:*

$\geq 70\%$	10 баллов;
69 – 60 %	9 баллов;
59 – 50 %	8 баллов;
49 – 40 %	7 баллов;
39 – 30 %	6 баллов;
менее 30 %	5 баллов.

#### Ответы на теоретические вопросы

1. Координационная формула 0,5 балла;

2. Типы химических связей  $0,5 \text{ балла} \times 3 = 1,5 \text{ балла};$

Названия механизмов образования ковалентных связей  $0,5 \text{ балла} \times 2 = 1 \text{ балл};$

*3. Уравнения реакций взаимодействия с недостатком*

*и избытком  $NH_3$  в водн.*

*1 балл  $\times 2 = 2$  балла;*

*4. Вывод формул для расчета выхода продукта*

*1 балл.*

*Изучение некоторых свойств полученного соединения*

*Опыт 1.*

*Наблюдения*

*0,5 балла;*

*Состав конденсата*

*0,5 балла;*

*Объяснение изменения цвета индикатора*

*0,5 балла;*

*Уравнение реакции термического разложения*

*1 балл.*

*Опыт 2.*

*Уравнение реакции диссоциации*

*1 балл;*

*Наблюдения*

*0,5 балла;*

*Состав черного налета*

*0,5 балла;*

*Уравнения реакций*

*1 балл  $\times 2 = 2$  балла.*

*Опыт 3.*

*Уравнение качественной реакции на сульфат-ион*

*1 балл;*

*Наблюдения*

*0,5 балла.*

*Опыт 4.*

*Наблюдения*

*0,5 балла;*

*Уравнение реакции*

*1 балл.*

*Опыт 5.*

*Наблюдения (при добавлении кислоты и при добавлении KI) 0,5 балла  $\times 2 = 1$  балл;*

*Уравнения реакций (при добавлении кислоты и при добавлении KI) 1 балл  $\times 2 = 2$  балла.*

*Итого за экспериментальный тур (максимальный балл)*

*30 баллов.*