

Московская олимпиада школьников по генетике 2021/22, 8 класс

10:00–23:59 19 фев 2022 г.

Часть 1

Выбор одного варианта ответа

№ 1

1 балл

Великий Винсент Ван Гог был уроженцем Голландии – центра выращивания тюльпанов в Европе. Одна из его работ посвящена полям тюльпанов. Допустим, цветовод обнаружил необычные мутантные тюльпаны с бахромчатыми лепестками. На следующий год на опытном поле он высадил исключительно дочерние луковицы мутантных растений. Какой результат стоит ему ожидать?



- мутация закрепится, гены бахромчатости перейдут в гомозиготное состояние
- мутация не закрепится, гены бахромчатости перейдут в гетерозиготное состояние
- все растения будут мутантные, но изменений генотипа не произойдет
- часть растений будут мутантные, но изменений генотипа не произойдет

№ 2

1 балл

Ген **A** картирован в одной из человеческих хромосом. Сколько аллелей гена **A** присутствует в делящейся диплоидной клетке на стадии метафазы второго деления мейоза?

1

2

3

4

№ 3

1 балл

У дрозофилы набор половых хромосом у самок XX , у самцов – XY , при этом пол определяется соотношением числа X -хромосом и гаплоидных аутосомных наборов. Какое число X -хромосом должно быть у дрозофилы, гексапloidной по аутосомам, чтобы она была самкой?

1

2

3

6

№ 4

1 балл

Карл Корренс, переоткрывший законы Менделя, взял два сорта гороха с желтыми и зелеными семенами, скрестил их, получил гибриды первого поколения, самоопылил их и получил расщепление 3 к 1 во втором поколении. Из второго поколения он выбрал только гетерозиготные растения, после чего самоопылил их и снова наблюдал расщепление. Какую часть потомства составляли зеленые горошины?

$\frac{1}{2}$

$\frac{1}{4}$

$\frac{1}{6}$

$\frac{1}{8}$

№ 5

1 балл

Какое расщепление по фенотипу будет получено от дигибридного скрещивания **Aabb** × **aaBb** при условии независимого наследования и неполного доминирования для обоих генов?

2 : 2 : 1 : 1 : 1

3 : 3 : 1 : 1

1 : 1 : 1 : 1

2 : 1 : 1

№ 6

1 балл

Для лечения больных раком щитовидной железы необходим рекомбинантный тиреотропный гормон. Его производят в промышленных масштабах при помощи микроорганизмов. Этого удалось добиться, применив метод:

- экстракорпорального оплодотворения
- классической селекции
- клеточной гибридизации
- генной инженерии

№ 7

1 балл

У одного из видов морских улиток пол определяется при взаимодействии с другими особями этого вида. Моллюски этого вида нагромождаются друг на друга, образуя холмик. Если молодые особи крепятся к ракушке самки, их пол - мужской. Если в колонии слишком много самцов, особь может поменять пол на женский. То же самое может произойти, если изменить положение особи. Как называется такой механизм детерминации пола?



- программным (определение пола до оплодотворения)**
- сингамным (пол определяется в момент оплодотворения)**
- эпигамным (определение пола спустя какое-то время после оплодотворения и в зависимости от экологических условий)**
- агамным (как результат бесполого размножения)**

№ 8

1 балл

У многих животных сразу после оплодотворения на стадии дробления зиготы геном самой зиготы ещё не начинает транскрибироваться. При этом делящимся клеткам нужно постоянно синтезировать белки. Как решается эта проблема?

- для транскрипции используются **внекромосомные элементы наследственности**
- для синтеза белков используется запас мРНК, образованный ещё во время созревания яйцеклетки
- для синтеза белков используется запас мРНК, образованный ещё во время созревания сперматозоида
- дробление происходит настолько быстро, что потребность в белках полностью покрывается белками, запасенными ещё во время созревания гамет

№ 9

1 балл

Сколько различных типов гамет образует в ходе мейоза организм с генотипом $2n = 12$ при условии отсутствия кроссинговера и при случайному расхождении отцовских и материнских хромосом?

- 64
- 32
- 24
- 12

№ 10

1 балл

При размножении бактерий бинарным делением единственным источником генотипической изменчивости являются

адаптации

модификации

морфозы

мутации

Часть 2

Выбор от одного до пяти верных ответов

№ 1

2 балла

Для каких видов никогда не соблюдаются менделевские закономерности наследования?

Амёба обыкновенная (*Amoeba proteus*)



Дрозофila (*Drosophila melanogaster*)



Кишечная палочка (*Escherichia coli*)



Нематода (*Caenorhabditis elegans*)





Резуховидка Таля (*Arabidopsis thaliana*)



№ 2

2 балла

Какие органеллы животной клетки ответственны за так называемую цитоплазматическую наследственность?



митохондрия



рибосома



гладкий ЭПР



шероховатый ЭПР



ядро

№ 3

2 балла

Тельце Барра (компактизированную инактивированную X-хромосому) можно наблюдать в клетках самок:

муравья

муравьеда

муравьиного льва

льва

львинки

№ 4

2 балла

У колокольчика за цвет лепестков отвечает два гена. Один ген (**A**) кодирует фермент, превращающий бесцветное вещество *X* в бесцветное вещество *Y*, второй ген (**B**) кодирует фермент, превращающий бесцветное вещество *Y* в голубой пигмент. Рецессивные аллели генов **A** и **B** не приводят к синтезу соответствующих ферментов. Выберите генотипы растений, лепестки которых окрашены в голубой.

AaBb

Aabb

AaBB

aaBB

aaBb

№ 5

2 балла

Какие расщепления по фенотипу (растения с голубыми лепестками : растения с белыми лепестками) могут получиться при самоопылении растений, выбранных вами в предыдущем задании?

13 : 3

15 : 1

9 : 7

3 : 1

2 : 1

Часть 3

Оцените верность суждений

№ 1

10 баллов

Выберите верные суждения

Генетический материал сперматиды полностью совпадает с генетическим материалом сперматозоида, который из неё образуется

Рибосомы архей состоят только из рибосомальных РНК

В ядрах растительных клеток может находиться более одного ядрышка

По мере дифференцировки стволовой кроветворной клетки человека в нейтрофил происходит смена экспрессируемых белков, но изменений в геноме не происходит

У пчёл определение пола гапло-диплоидное: самцы развиваются из неоплодотворенных яйцеклеток, а самки - из оплодотворенных. При такой системе определения пола дочь королевы колонии в среднем имеет больше общих генов со своими сестрами, чем с братьями

Рецессивное заболевание человека, сцепленное с X -хромосомой, в равновесной популяции чаще встречается у мужчин, чем у женщин

Пренатальная диагностика не позволяет обнаружить у плода до рождения мутации, приводящие к развитию синдрома Дауна

В геноме архей, в отличие от бактерий и эукариот, может встречаться необычное основание – дигидроурацил

В клетках растений наследственную информацию могут хранить хромопластины

В норме кроссинговер в жизненном цикле печеночных мхов происходит при образовании гамет



Часть 4

Решите задачи

№ 1

6 баллов

Соотнесите буквенные обозначения на картинке с стадиями митоза.




На картинке изображено деление клеток в бластуле рыбы сига. Его гаплоидный набор составляет 40 хромосом. Сколько хроматид на стадии Б?

160

№ 2

6 баллов


Соотнесите фазу со структурой или процессом, которые можно в ней наблюдать








№ 3

6 баллов


Соотнесите структуры с микрофотографиями










политенные хромосомы





хромосомы по типу "ламповых щеток"




ядрышковый организатор



полирибосомы на мРНК



теломерная петля




нуклеоид



№ 4

9 баллов

На рисунке представлена родословная семья, два члена которой страдают наследственным заболеванием по гену A. У родителей 1 и 2 родился один здоровый ребенок и двое больных. Другие члены семьи, представленные на родословной, наследственных заболеваний не имеют.



Какой генотип у 2?

AA

Aa

A-

aa

Какой генотип у 6?

AA

Aa

A-

aa

Какова вероятность, что следующий ребёнок пары 1 и 2 будет девочкой с заболеванием?

0.125

Какова вероятность, что следующий ребёнок пары 5 и 6 будет с заболеванием?

0

Какова вероятность, что среди следующих двух детей пары 1 и 2 будет хотя бы одна здоровая девочка?


39/64

№ 5

12 баллов

Было установлено, что окраска панциря жука с планеты Карапаксиан определяется тремя генами – **A**, **B** и **C**. Мутантные аллели **a** и **c** рецессивны, гомозиготность по любому из них приводит к полному отсутствию пигментации. Жуки с одним мутантным аллелем **B2** имеют небольшое количество белых пятен в окраске, с двумя аллелями **B2** – много пятен. Установлено, что ген **B** локализован в половой хромосоме. Мужской пол у жуков – XO (одна X-хромосома, без Y), женский – XX (две X-хромосомы). Жуки дикого типа имеют темную окраску.

Сопоставьте фенотип с генотипом



Запишите расщепление по фенотипам при скрещивании $\text{AACcX}^{B2}O \times \text{AaCCX}^{B1}X^{B2}$

Самки, темный панцирь 0

Самки, темный панцирь с малым числом пятен 1

Самки, темный панцирь с большим числом пятен 1

Самки, белый панцирь 0

Самцы, темный панцирь 1

Самцы, темный панцирь с малым числом пятен 1

Самцы, темный панцирь с большим числом пятен 0

Самцы, белый панцирь 0

№ 6

12 баллов

Гены **A** и **B** сцеплены в транс-положении и находятся на расстоянии, эквивалентном 12% кроссинговера. Ген **C** находится на другой хромосоме. Гены **A** и **C** взаимодействуют по типу некумулятивной полимерии. Ген **B**, в случае наличия хотя бы одного его доминантного аллеля, подавляет признак, за который отвечают доминантные аллели генов **A** и **C**.

Запишите долю каждой гаметы организма с генотипом **AaBbCc** в процентах.

ABC 3

ABc 3

AbC 22

Abc 22

aBC 22

aBc 22

abC 3

abc 3

У какой доли потомства от скрещивания двух тригетерозигот будет проявляться признак, кодируемый генами **A** и **C**?

0.2491


№ 7

11 баллов

Клеточным циклом называют время и процессы, протекающие от одного митотического деления до другого. Клеточный цикл включает в себя 4 фазы:

- митоз – клеточное деление;
- $G1$ – выход из клеточного деления, восстановление нормального размера клетки;
- S – синтетическая фаза, удвоение генетической информации;
- $G2$ – подготовка к митозу.

Для определения продолжительности клеточного цикла у штамма дрожжей был поставлен следующий эксперимент. Клетки дрожжей были внесены в чистую среду, исходная концентрация составила $5 \cdot 10^6$ клеток/мл. Через 80 ч, количество клеток возросло до $20 \cdot 10^6$ клеток/мл. Затем часть культуры инкубировали в течение 20 минут в среде, содержащей меченный тимидин. После инкубации клетки отмыли и перенесли в новую питательную среду с немеченым тимидином. В течение определенного времени периодически брали пробы и измеряли процент митотических клеток, содержащих меченный тимидин. В каждой пробе около 1% всех клеток находилось на стадии митоза. Результаты эксперимента приведены на рисунке.



В какую фазу жизненного цикла клетка включает меченный тимидин?

МИТОЗ

$G1$

S

$G2$

Какова общая продолжительность жизненного цикла в часах?

Округляйте по правилам округления до целых!

40

Какова продолжительность фазы $G1$ в жизненном цикле в часах?

Округляйте по правилам округления до целых!

28

Какова продолжительность фазы S в жизненном цикле в часах?

Округляйте по правилам округления до целых!

5

Какова продолжительность фазы $G2$ в жизненном цикле в часах?

Округляйте по правилам округления до целых!

7

Какова продолжительность фазы митоза в жизненном цикле в часах?

Округляйте по правилам округления до десятых!

0.4

№ 8

8 баллов

Ген **S** отвечает за синтез белка *P* в клетке. Один функциональный аллель **S** обеспечивает синтез x молекул белка в минуту, а мутантный аллель **s** не приводит к образованию белка. Время жизни молекулы белка *P* составляет 6 минут. Необходимая для нормального функционирования клетки равновесная концентрация белка составляет $7,25x$ молекул на клетку.

Мутация является

- доминантной, доминирование полное**
- доминантной, доминирование неполное**
- рецессивной, доминирование полное**
- рецессивной, доминирование неполное**

Какова равновесная концентрация белка в рецессивной гомозиготе?

12 x

Какова равновесная концентрация белка в доминантной гомозиготе?

0 x

Лекарственный препарат *L* повышает скорость синтеза с одного аллеля до $1,5x$ молекул белка в минуту.

Какова равновесная концентрация белка в гетерозиготе через 1 минуту после введения лекарственного препарата *L*?

6.5 x

Позволит ли постоянное употребление препарата *L* поддерживать необходимую концентрацию белка *P* в гетерозиготных клетках?

- да**
- нет**