

Московская олимпиада школьников по вероятности и статистике  
27 января 2024 г.

9 класс. Ответы и решения

**Задача 1 (1 балл).** В коробке много конфет тёмного шоколада и еще больше конфет белого шоколада. Четыре случайные конфеты случайным образом поделили между Валеи и Колей поровну. Известно, что вероятность того, что у обоих окажутся по одной тёмной и одной белой конфете, равна  $\alpha$ , а вероятность того, что хотя бы у одного из них окажутся тёмная и белая конфеты, равна  $\beta$ . Найдите вероятность того, что у Валеи окажутся две конфеты одного цвета.

**Ответ:**  $1 - \frac{\alpha + \beta}{2}$ .

**Решение.** Обозначим буквами  $B$  и  $K$  события «у Валеи разные конфеты» и «у Колеи разные конфеты» соответственно. Вероятности этих событий одинаковы в силу симметрии:  $P(B) = P(K)$ . Из равенства

$$P(B \cup K) = P(B) + P(K) - P(B \cap K)$$

получаем:

$$\beta = 2P(B) - \alpha; \quad P(B) = \frac{\alpha + \beta}{2}; \quad P(\bar{B}) = 1 - \frac{\alpha + \beta}{2}.$$

**Задача 2 (1 балл).** У папы есть коробка, в которой лежат одинаковые по размеру шары разных цветов: красного, жёлтого и синего. Вова собирается вынуть из коробки случайный шар. Он спрашивает папу: «Какого цвета шар мне вероятнее всего попадётся?» Папа отвечает: «Синего». Вова переспрашивает: «Значит, вероятнее всего, что мне попадётся синий шар?» «Нет, вероятнее всего, что синий шар тебе не попадётся», – отвечает папа. Какое наименьшее количество шаров может быть в коробке, если папа всегда говорит правду?

*Автор задачи Геннадий Гусев, 6 класс*

**Ответ:** 7.

**Решение.** Если шаров какого-то цвета нет (во время олимпиады были вопросы, может ли так быть), то указанная в условии ситуация невозможна. В коробке есть хотя бы по одному шару каждого цвета. Значит, синих шаров, по крайней мере, два.

Если синих шаров два, то желтых и красных должно быть по одному. Но в этом случае нарушается второе условие: вероятность вынуть синий шар оказывается не меньше, а равна вероятности вынуть не синий шар.

Если синих шаров три, то красных и желтых вместе должно быть хотя бы 4. Следовательно, наименьшее количество шаров не меньше чем 7.

Пример: три синих шара, два желтых и два красных удовлетворяют условию.

**Задача 3.** Кот Базилио предложил Буратино и Пьеро сыграть с ним в новую лотерею. Вначале Буратино и Пьеро вносят по 19 сольдо, а кот вносит 82 сольдо. Затем Буратино и Пьеро бросают по игральному кубику. Если число очков, выпавшее у Буратино, делится на число очков, выпавшее у Пьеро, то Буратино забирает свой выигрыш – в 20 раз больше сольдо, чем выходит в частном, а если не делится, то Буратино не получает ничего. Если число очков, выпавшее у Пьеро, делится на число очков, выпавшее у Буратино, то Пьеро забирает в 20 раз больше сольдо, чем выходит в частном, а если не делится, то не получает ничего. Деньги, оставшиеся после выплаты выигрышей Буратино и Пьеро, кот забирает себе. Кот утверждает, что игра честная, поскольку для каждого из троих игроков вероятность получить больше, чем игрок внёс вначале, одна и та же.

**а) (1 балл)** Верно ли, что вероятность получить больше первоначального взноса одна и та же для всех троих игроков?

**б) (1 балл)** Является ли игра честной с точки зрения среднего выигрыша, то есть верно ли, что математическое ожидание прибыли от лотереи равно 0 для каждого игрока?

**Ответ:** а) да; б) нет.

**Решение.** Суммарный взнос равен 120 сольдо. Пусть Буратино выбросил  $n$  очков, а Пьеро –  $k$  очков. Составим таблицу, в которой клетки соответствуют всем 36 возможным исходам бросков, а в клетках запишем выигрыши Буратино, Пьеро и Кота, разделив их наклонными чертами.

$k \backslash n$	1	2	3	4	5	6
1	20/20/80	40/0/80	60/0/60	80/0/40	100/0/20	120/0/0
2	0/40/80	20/20/80	0/0/120	40/0/80	0/0/120	60/0/60
3	0/60/60	0/0/120	20/20/80	0/0/120	0/0/120	40/0/80
4	0/80/40	0/40/80	0/0/120	20/20/80	0/0/120	0/0/120
5	0/100/20	0/0/120	0/0/120	0/0/120	20/20/80	0/0/120
6	0/120/0	0/60/60	0/40/80	0/0/120	0/0/120	20/20/80

Оранжевым цветом отмечены исходы, в которых Буратино получил больше 19 сольдо, а зеленым – исходы, в которых кот получил больше 82 сольдо. И тех, и других по 14. Следовательно, вероятности выигрыша Буратино и вероятность выигрыша кота одинаковы – по  $\frac{14}{36} = \frac{7}{18}$ . Вероятность выигрыша Пьеро такая же, поскольку Буратино и Пьеро в равных условиях.

Математическое ожидание выигрыша кота равно

$$20 \cdot \frac{2}{36} + 40 \cdot \frac{2}{36} + 60 \cdot \frac{4}{36} + 80 \cdot \frac{12}{36} + 120 \cdot \frac{14}{36} = \frac{20}{18} \cdot (1 + 2 + 6 + 24 + 42) = \frac{750}{9} = 83 \frac{1}{3}$$

сольдо, а это больше, чем взнос кота. Значит, математическое ожидание выигрыша у Буратино и у Пьеро меньше, чем их взносы. Игра нечестная.

Московская олимпиада школьников по вероятности и статистике  
27 января 2024 г.

**Задача 4.** Группа, в которой 27 студентов, сдает письменный зачёт по решению олимпиадных задач. Преподаватель заготовил зачётную работу в 3 вариантах и распределяет варианты случайным образом с единственным условием: количество тех, кто получил разные варианты, должно отличаться не больше чем на единицу. Перед зачётом между студентами Сергеем и Алексеем состоялся следующий диалог.

С: Вероятность того, что у нас с тобой окажется один и тот же вариант, равна  $1/3$ .

А: Если сегодня кто-то один не придёт на зачёт, то она окажется меньше, чем была бы, если бы пришли все.

С: Если сегодня не придут двое, то она окажется меньше, чем была бы, если бы не пришёл кто-то один.

**а) (1 балл)** Верно ли первое утверждение Сергея?

**б) (1 балл)** Верно ли утверждение Алексея?

**в) (1 балл)** Верно ли второе утверждение Сергея?

**Ответ:** а) нет; б) нет; в) да.

**Решение.** а) Пусть Сергей получил какой-то вариант. Тогда для Алексея вариантов с этим же номером остается меньше, чем треть общего числа оставшихся вариантов. Поэтому вероятность совпадения меньше, чем  $1/3$ .

б) Если на зачёт придут все, то вероятность совпадения равна  $\frac{8}{26} = \frac{4}{13}$ . Если не придёт кто-то один, то варианты распределятся так: 9 студентов получили один вариант, еще 9 – другой вариант, и еще 8 – третий. В этом случае вероятность совпадения вариантов равна

$$\frac{9}{26} \cdot \frac{8}{25} + \frac{9}{26} \cdot \frac{8}{25} + \frac{8}{26} \cdot \frac{7}{25} = \frac{8 \cdot 25}{26 \cdot 25} = \frac{4}{13}.$$

**Решение без вычислений.** Можно считать, что отсутствующий студент все же пришёл, взял последний оставшийся вариант и ушёл с ним — для Сергея и Алексея ничего не изменилось.

в) Если не придут двое, то варианты распределятся так: 9, 8 и 8. Вероятность совпадения равна

$$\frac{9}{25} \cdot \frac{8}{24} + \frac{8}{25} \cdot \frac{7}{24} + \frac{8}{25} \cdot \frac{7}{24} = \frac{8 \cdot 23}{25 \cdot 24} = \frac{23}{75} < \frac{4}{13}.$$

**Решение почти без вычислений:** если бы все тянули варианты наугад, и два листка в остались бы в конце, то вероятность события «С. и А. получат один и тот же вариант» была бы  $\frac{4}{13}$ . Случай, когда остались два одинаковых варианта, более благоприятен для

того, чтобы А. и С. получили одинаковые варианты, потому что  $2 \cdot 9 \cdot 8 + 7 \cdot 6 > 9 \cdot 8 + 2 \cdot 8 \cdot 7$ . Но этот случай невозможен по условию, значит, вероятность совпадения вариантов у С. и А. меньше  $\frac{4}{13}$ .

**Задача 5 (2 балла).** В случайном эксперименте 8 элементарных событий, и все они равно-возможны. Пусть  $M$  – множество всех событий этого опыта, кроме невозможного (пустого) события. Событие  $A \in M$  имеет вероятность 0,75. Сколько в множестве  $M$  случайных событий  $B$  таких, что события  $A$  и  $B$  независимы?

**Ответ:** 41.

**Решение.** Пусть события  $A$  и  $B$  независимы. Тогда  $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$ . Если событию  $B$  благоприятствует  $b$ , а событию  $A \cap B$  благоприятствует  $c$  элементарных событий, то получается равенство  $0,75 \cdot \frac{b}{8} = \frac{c}{8}$ , откуда  $3b = 4c$ .

Учитывая, что числа  $b$  и  $c$  натуральные и что  $c \leq b \leq 8$  и  $c \leq 6$ , получаем два варианта.

1.  $b = 8, c = 6$ , т. е. событие  $B$  достоверное.

2.  $b = 4, c = 3$ . То есть событию  $B$  благоприятствуют 3 из 6 элементарных событий, входящих в  $A$ , и одно из двух, не входящих в  $A$ . Выбрать такое подмножество элементарных событий можно  $C_6^3 \cdot C_2^1 = 40$  способами. Всего получается 41 событие.

**Задача 6 (3 балла).** Имеются два несимметричных игральных кубика. Известно, что:

- вероятность выпадения 1 очка на первом кубике равна 0,14;
- вероятность выпадения 1 очка на втором кубике равна 0,35;
- при всех  $n$  от 2 до 6 отношение вероятности выпадения  $n$  очков к вероятности выпадения  $n-1$  очков на первом кубике в точности в  $\frac{n}{n-1}$  раз больше, чем это же отношение для второго кубика.

Найдите математическое ожидание числа очков, выпадающих при бросании второго кубика.

**Найдите математическое ожидание числа очков, выпадающих при бросании второго кубика.**

**Ответ:** 2,5.

**Решение.** Пусть вероятности граней на первом и на втором кубиках равны  $v_1, \dots, v_6$  и  $k_1, \dots, k_6$  соответственно. Тогда

$$\frac{v_2}{v_1} = 2 \frac{k_2}{k_1}, \text{ откуда } v_2 k_1 = 2 v_1 k_2,$$

$$\frac{v_3}{v_1} = \frac{v_3}{v_2} \frac{v_2}{v_1} = \frac{3}{2} \frac{k_3}{k_2} \cdot 2 \frac{k_2}{k_1} = 3 \frac{k_3}{k_1}, \text{ откуда } v_3 k_1 = 3 v_1 k_3.$$

Таким же образом получаем все равенства  $v_n k_1 = n v_1 k_n$  при  $n = 2, \dots, 6$ . Сложим полученные равенства почленно:

$$v_1 (2k_2 + 3k_3 + \dots + 6k_6) = k_1 (v_2 + v_3 + \dots + v_6).$$

Добавим к обеим частям  $v_1 k_1$ :

$$v_1 (k_1 + 2k_2 + 3k_3 + \dots + 6k_6) = k_1 (v_1 + v_2 + v_3 + \dots + v_6).$$

Математическое ожидание числа очков на втором кубике равно

$$k_1 + 2k_2 + 3k_3 + \dots + 6k_6 = \frac{k_1}{v_1} (v_1 + v_2 + v_3 + \dots + v_6) = \frac{k_1}{v_1} = 2,5.$$

*Авторы задач: Геннадий Глебов (6-й класс), Н.И.Соштова, П.В.Семенов, А.В.Шкляев, И.Р.Высоцкий.*